

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

«МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЯЩУРА»

ЯЩУР – инфекционная, остро протекающая и быстро распространяющаяся болезнь парнокопытных животных, вызываемая одним из вариантов вируса типов О.А.С.САТ-1, САТ-2, САТ-3 и Азия-1. Характерными клиническими признаками болезни являются кратковременная лихорадка, афты и эрозии на слизистой оболочке ротовой полости, на коже венчика и межкопытной щели, носового зеркала, вымени. Возможно переболевание животных со стертыми клиническими признаками. У новорожденного молодняка ящур может протекать в сверхострой форме со смертельным исходом без образования афт. Животные, переболевшие вирусом одного типа, могут заболеть в случае заражения вирусом другого типа.

Источник болезни – больные животные, в том числе находящиеся в инкубационном (скрытом) периоде болезни, который обычно длится от 1 до 7 дней, а иногда до 21 дня. Такие животные выделяют вирус во внешнюю среду с содержимым и стенками афт, молоком, слюной, выдыхаемым воздухом, мочой и фекалиями. При остром течении болезни – у крупного рогатого скота отмечаются ухудшения аппетита, вялая жвачка, повышенное слюноотделение. Затем повышение температуры тела до 40,5-41,5 С, угнетение, отказ от корма, прекращение жвачки. На 2-3 день на внутренней поверхности нижней и верхней губ, на беззубом крае нижней челюсти, на языке и слизистой оболочке щек появляются афты, у некоторых животных – в межкопытцевой щели и на вымени. Через 12-24 часа стенки афт разрываются, образуются эрозии, в это время температура тела понижается до нормальной, наступает обильное слюнотечение. У телят ящур протекает в безафтозной форме с явлением острого гастроэнтерита. У свиней отмечаются лихорадка, угнетение, ухудшение аппетита. На коже конечностей, в области межкопытцевой щели, венчика и мякишей появляются красные болезненные припухлости, затем афты, которые, разрываясь, образуют эрозии. Заболевание конечностей сопровождается хромотой, иногда спаданием копытца. Чаще афты появляются на пяточке, сосках и редко на слизистой ротовой полости. У взрослых свиней заболевание ящуром длится 8-25 дней, у поросят – сосунов протекает в септической форме, и в первые 2-3 дня болезнь вызывает гибель 60-80% животных.

ЯЩУРОМ МОЖЕТ БОЛЕТЬ ЧЕЛОВЕК. ЗАРАЗИТЬСЯ ЯЩУРОМ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ТОЛЬКО ОТ ЖИВОТНЫХ, КОНТАКТИРУЯ С НИМИ И УПОТРЕБЛЯЯ ЗАРАЖЕННЫЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ В СЫРОМ ВИДЕ.

Для профилактики заболевания животных ящуром владельцы животных обязаны соблюдать следующее:

1. Строго соблюдать ветеринарно-санитарные правила содержания животных;

2. Приобретать корма из благополучных по заразным болезням территорий;
 3. Обеспечить регулярное проведение дезинфекции мест содержания животных, хранения и приготовления кормов, а также транспортных средств, при въезде на территорию хозяйств;
 4. Систематически проводить дератизацию и дезинсекцию;
 5. Обеспечить работу хозяйства (подворья) по закрытому типу, исключить допуск к местам содержания животных посторонних лиц, исключить завоз необработанного инвентаря и заезд на территорию транспортных средств, не прошедших специальную обработку;
 6. Не приобретать животных и продукцию животного происхождения в местах несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов.
 7. Всех вновь приобретаемых животных регистрировать в учреждениях государственной ветеринарной службы и осуществлять обязательное карантинирование животных;
 8. Не допускать убоя животных и использование мяса и мясопродуктов без ветеринарно-санитарной экспертизы;
 9. Не допускать ввоза (вывоза) на территорию населенных пунктов района кормов без ветеринарных сопроводительных документов;
 10. По первому требованию ветеринарных специалистов предъявлять животных для профилактических осмотров и иммунизации.
 11. Выполнять требования ветеринарных специалистов по соблюдению ветеринарно-санитарных правил по профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных.
 12. О каждом случае заболевания животных не зависимо от установленного диагноза падежа животных сообщать на станцию по борьбе с болезнями животных или ее представителям на местах.
- Обо всех случаях внезапного падежа или об одновременных массовых заболеваниях животных НЕМЕДЛЕННО сообщить в Южное межрегиональное управление Россельхознадзора по телефону +7-978-030-99-05.**

До прибытия ветеринарного специалиста владельцы животных **ОБЯЗАНЫ** сделать следующее:

- изолировать больных и подозрительных по заболеванию животных, закрепить отдельный обслуживающий персонал, исключив контакт его с лицами, ухаживающими за другими животными. Остальных животных оставить на месте, и не допускать их перевода в другие помещения и на другие участки пастбищ;
- запрещается выезжать на транспорте любого вида, принадлежащим хозяйствам, частным лицам, из пункта, находящегося в карантине;
- домашнюю птицу на территории неблагополучного пункта содержат в закрытых помещениях, а собак - на привязи;

- не допускать передвижения людей за пределы неблагополучного пункта без соблюдения мер и порядка, установленных местными ветеринарными органами и комиссией по борьбе с ящуром;
- лица, обслуживающие больной или подозрительной в заболевании ящуром скот должны быть обеспечены сменной одеждой и обувью, полотенцами, мылом и дезрастворами для обработки рук, а также аптечкой первой медицинской помощи

Кратковременная лихорадка, афты и эрозии на слизистой оболочке ротовой полости, на коже венчика и межкопытной щели, носового зеркала, дёсны. Заболевание переболевших животных со стертыми клиническими признаками. У новорожденного животного ящур может протекать в острой форме со смертельным исходом без образования афт. Животные, переболевшие вирусом одного типа, могут заболеть в случае заражения другим типом.

Источники болезни - больные животные, в том числе и находящиеся в инкубационном (скрытом) периоде болезни, который длится от 1 до 7 дней, а иногда до 21 дня. Такие животные выделяют вирус во внешнюю среду в содержимом и стенках афт, молоком, слюной, выдыхаемом воздухом, мочой и фекалиями. При остром течении болезни - у животных рожатого скота отмечаются ухудшения аппетита, вялая жвачка, помешанность, спазмоладение. Затем повышается температура тела до 40,5-41,5.

Поверхности языка и внутренней губы, на переднем крае нижней челюсти, на языке и слизистой оболочке десны образуются афты, у некоторых животных - в межкопытной щели и на вымени. Через 12-24 часа сырые афты разрываются, образуются эрозии, в это время температура тела у заболевших до нормальной, наступает обильное выделение слюны. Болезнь протекает в безафтной форме с явлениями острого гастроэнтерита. У свиней отмечаются лихорадка, угнетение, ухудшение аппетита. На коже и конечностях в области припухлости, затем афты, которые, разрываясь, образуют эрозии. Заболевание конечностей сопровождается жаротой, иногда спазмом конечности. Чаще афты появляются на внутренней губе и языке на слизистой ротовой полости. У взрослых свиней заболевание ящуром длится 8-25 дней, поросят - сосунов протекает в септической форме, и в среднем 2-3 дня болезнь вызывает гибель 60-80% животных.

ЯЩУРОМ МОЖЕТ БОЛЕТЬ ЧЕЛОВЕК. ЗАРАЗИТЬСЯ ЯЩУРОМ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ТОЛЬКО ОТ ЖИВОТНЫХ, КОРМАЧИКИ И ПИЩИ И УПОТРЕБЛЯТЬ ЗАРАЖЕННЫЕ МОЛОКО И МЯСО ПРОИЗВЕДЕННЫЕ В СЫРОМ ВИДЕ.

Для профилактики заболевания животным ящуром владельцы животных обязаны соблюдать следующие:

Строго соблюдать ветеринарно-санитарные правила содержания животных.